

# АКВА МАРИС®



## ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения  
АКВА МАРИС® Стронг

### РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР

ЛС-002319

**ТОРГОВОЕ НАЗВАНИЕ ПРЕПАРАТА:** Аква Марис® Стронг

### ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА

Спрей для местного применения

### СОСТАВ

100 % стерильный гипертонический раствор воды Адриатического моря, с натуральными солями и микроэлементами.

Не содержит консервантов.

Присутствие ионов:

Натрий (Na <sup>+</sup> )	– не менее 7,50 мг/мл;
Кальций (Ca <sup>2+</sup> )	– не менее 0,25 мг/мл;
Калий (K <sup>+</sup> )	– не менее 0,20 мг/мл;
Магний (Mg <sup>2+</sup> )	– не менее 1,00 мг/мл;
Хлориды (Cl <sup>-</sup> )	– не менее 16,50 мг/мл;
Сульфаты (SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> )	– не менее 1,80 мг/мл;
Гидрокарбонаты (HCO <sub>3</sub> <sup>-</sup> )	– не менее 0,10 мг/мл;
Бромиды (Br <sup>-</sup> )	– не менее 0,04 мг/мл.

### ОПИСАНИЕ:

прозрачный бесцветный раствор со слабым характерным морским запахом.

### ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГРУППА

Препарат для лечения заболеваний горла.

**КОД АТХ:** R02A

### ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Препарат на основе гипертонического стерильного раствора морской воды применяется с лечебными, профилактическими и гигиеническими целями для очищения, снятия раздражения и защиты слизистой оболочки горла.

Микроэлементы, входящие в состав препарата, усиливают резистентность слизистой оболочки горла к болезнетворным бактериям и вирусам, способствуют повышению местного иммунитета.

### ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- для профилактики и в комплексном лечении острых и хронических, инфекционных и воспалительных заболеваний горла (тонзиллит, аденоидит, фарингит, ларингит).
- для профилактики и в комплексном лечении ОРВИ (в том числе беременным женщинам и в период лактации);
- пациентам, страдающим сухостью слизистой оболочки задней стенки глотки вследствие повышенной сухости или загрязнения воздуха (центральное отопление, кондиционирование) с целью сохранения физиологических характеристик слизистой оболочки горла в измененных микроклиматических условиях.

### ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Повышенная чувствительность к препарату.

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ:

Спрей для местного применения.

Взрослым и детям 4–6 раз в сутки по 3–4 впрыскивания, направляя распылитель на заднюю стенку глотки.

Перед использованием повернуть распылитель в горизонтальное положение.

При использовании в первый раз нажать на крышку несколько раз.

### ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Возможны аллергические реакции.

### ПЕРЕДОЗИРОВКА

Случаи передозировки не отмечены.

### ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ

Препарат не оказывает системного воздействия на организм, взаимодействия с другими лекарственными препаратами не отмечено. Возможно применение с другими лекарственными средствами, используемыми для лечения воспалительных заболеваний горла.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

С осторожностью использовать детям младше 1 года.

### СПОСОБНОСТЬ ВЛИЯТЬ НА СКОРОСТЬ РЕАКЦИИ ПРИ УПРАВЛЕНИИ АВТОТРАНСПОРТОМ ИЛИ РАБОТЕ С ДРУГИМИ МЕХАНИЗМАМИ

Нет данных.

### ФОРМА ВЫПУСКА

По 30 мл препарата в стеклянном флаконе темного цвета с распылительным устройством. Один флакон вместе с инструкцией по применению помещен в картонную пачку.

### СРОК ГОДНОСТИ

3 года.

Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ


При температуре не выше 25°C, в недоступном для детей месте.

### УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК

Без рецепта.

### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ЯДРАН-ГАЛЕНСКИ ЛАБОРАТОРИЙ а.о.,  
Свилно 20, 51000 Риека, Хорватия.



Претензии к качеству препарата следует направлять в адрес  
Представительства ЯДРАН-ГАЛЕНСКИ ЛАБОРАТОРИЙ а.о. в России  
119330, г.Москва, Ломоносовский пр-т, д.38, оф.33,  
тел./факс: (495) 970-18-82, 970-18-83.

jgl